

# ino BACT N

## SKŁAD

*Bacillus amyloliquefaciens* I-4995 oraz I-4996 : 10<sup>9</sup> jtk/ml  
Forma: płyn

Termin przydatności: 12 miesięcy (od daty produkcji)

Produkt nie zawiera organizmów genetycznie zmodyfikowanych i organizmów chorobotwórczych (salmonelli, bakterii coli typu kałowego, tlenowych mezofilnych i jej nicieni).

## ZALECENIA UPRAWOWE

### Opyskiwać roztworem resztki poźniwne.\*\*

Resztki poźniwne zaleca się opyskiwać rano, wieczorem lub w dni pochmurne, aby uniknąć nadmiernego nasłonecznienia.

Po zastosowaniu produktu:

- na resztki poźniwne wykonać orkę lub płytką uprawę gleby nie później niż 24-48 godzin po oprysku
- w przypadku uprawy bezorkowej zabiegi doprawiające oraz siew wykonać w ciągu 24-48 godzin po zastosowaniu produktu.

### \*\* Dawkowanie:

- zalecana dawka produktu: 0,5 l/ha
- zalecana ilość wody: minimum 200 l/ha

## ZALECENIA STOSOWANIA

Wstrząsnąć przed użyciem.

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując produkt samodzielnie - bez mieszania z innymi.

Używać czystego opryskiwacza.

Dostosować ilość wody do opryskiwanej powierzchni.

Nie stosować produktu 4-7 dni przed lub po użyciu herbicydów.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P102 - chronić przed dziećmi.

P201 - przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P270 - nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P501 - pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.

Pusty pojemnik dostarczyć do miejsc utylizacji.

Produkt zawiera bakterie. Mikroorganizmy mogą powodować reakcje uczuleniowe. Użytkując preparat, zawsze nosić maskę przeciwpyłową (typ EN 149 FFP3 lub podobną), rękawice i odpowiednią odzież ochronną. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością lub przechodzące leczenie immunosupresyjne.

## MIESZANIE Z INNYMI PREPARATAMI

INO BACT N można mieszać z większością nawozów i fungicydów. W takich przypadkach należy wcześniej wykonać test zgodności. Zawsze dodawać INO BACT N jako ostatni produkt. Nie używać chlorowanej wody ani wybielacza, który mógłby zniszczyć bakterie i spowodować, że produkt będzie nieskuteczny. Unikać mieszanin z herbicydami. Przed użyciem wyczyścić opryskiwacz, aby uniknąć obecności pozostałości innych substancji w opryskiwaczu.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, zwierząt i artykułów spożywczych, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 4°C do 25°C włącznie, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i od mrozu.

Biznes  
UP↑  
B

Dystrybutor:  
Biznes Up Egberss Kocel Sikorski  
Obłaczkowo 11c  
62-300 Września  
[www.biznes-up.com.pl](http://www.biznes-up.com.pl)

UTYLIZACJA - Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób. Unikać uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wypluć trzykrotnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów.

ZASTRZEŻENIE - Producent i sprzedawcy tego produktu gwarantują, że oryginalnie zamknięte opakowanie zawiera określoną w etykiecie składnik w ramach dopuszczonej tolerancji. Nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikające z przechowywania, obsługi, stosowania lub użytkowania tego produktu.

DE SANGOSSE  
«Bonnell» - CS 10005  
47480 PONT DU CASSE  
Francja

Masa netto: **5 kg**

ino  
SOIL  
ACTIVATOR