



BACT P

SKŁAD

Bacillus megaterium 10⁹ jtk/ml
Streptomyces beta-vulgaris 10⁹ jtk/ml
Burkholderia sp. 10⁹ jtk/ml
Forma: płyn
Termin przydatności: 12 miesięcy (od daty produkcji)

Produkt nie zawiera organizmów genetycznie zmodyfikowanych i organizmów chorobotwórczych (salmonelli, bakterii coli typu kałowego, tlenowych mezofili i nicieni).

ZALECENIA UPRAWOWE

Fertygacja lub bezpośrednie stosowanie na glebę w formie oprysku:

- zboża: 0,5 l/ha
- rzepak: 0,5 l/ha
- kukurydza i słonecznik: 0,5 l/ha
- warzywa: 0,5 l/ha
- winorośla i drzewa owocowe: 0,5 l/ha stosowane poprzez system nawadniania z pierwszym nawadnianiem

W procesie przygotowania granulowanych nawozów NPK:

- 5-10 l/tonę nawozu

ZALECENIA STOSOWANIA

Wstrząsnąć przed użyciem.
Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując produkt samodzielnie – bez mieszania z innymi.
Używać czystego opryskiwacza.
Dostosować ilość wody do opryskiwanej powierzchni.
Nie stosować produktu 4-7 dni przed lub po użyciu herbicydów.

UTYLIZACJA: Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób. Unikać uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wypluć trzykrotnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów.

ZASTRZEŻENIE - Producent i sprzedawcy tego produktu gwarantują, że oryginalnie zamknięte opakowanie zawiera określone w etykiecie składniki w ramach dopuszczalnej tolerancji. Nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikające z przechowywania, obsługi, stosowania lub użytkowania tego produktu.

DE SANGOSSE
«Bonnell» - CS 10005
47480 PONT DU CASSE
Francja

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- P102 - chronić przed dziećmi.
 - P202 - nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
 - P264 - dokładnie umyć ręce po użyciu.
 - P501 - pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.
- Pusty pojemnik dostarczyć do miejsc utylizacji.

Produkt zawiera bakterie. Mikroorganizmy mogą powodować reakcje uczuleniowe. Użytkując preparat, zawsze nosić maskę przeciwpyłową (typ EN 149 FFP3 lub podobną), rękawice i odpowiednią odzież ochronną. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością lub przechodzące leczenie immunosupresyjne.

MIESZANIE Z INNYMI PREPARATAMI

INO BACT P można mieszać z większością nawozów i fungicydów. W takich przypadkach należy wcześniej wykonać test zgodności. Zawsze dodawać INO BACT P jako ostatni produkt. Nie używać chlorowanej wody ani wybielacza, który mógłby zniszczyć bakterie i spowodować, że produkt będzie nieskuteczny. Unikać mieszania z herbicydami. Przed użyciem wyczyścić opryskiwacz, aby uniknąć obecności pozostałości innych produktów w opryskiwaczu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, zwierząt i artykułów spożywczych, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 4°C do 25°C włącznie, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i od mrozu.

Biznes
UP ↑ B

Dystrybutor:
Biznes Up Egberss Kocel Sikorski
Obłączkowo 11c
62-300 Września
www.biznes-up.com.pl



SOIL
ACTIVATOR

Masa netto: **5 kg**