



PRODUKT ZUŻYĆ PO OTWARCIU OPAKOWANIA.

SKŁAD:

Methylobacterium sp. AGN12 : 10⁹ jtk/g
Methylobacterium sp. AGN13 : 10⁹ jtk/g
Arthrobacter sp. AGN14 : 10⁹ jtk/g

Forma: płyn

Termin przydatności: 18 miesięcy dąty produkcji
 Produkt nie zawiera organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Produkt dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporządzeniem WE 2018/848.

ZALECENIA UPRAWOWE

- Stosowanie dolistne na dobrze rozwinięte liście, przez cały rok, we wszystkich uprawach.
- ZBOŻA: 0,5 l/ha, od fazy 1-2 kolanaka do liścia flagowego BBCH 31-39
 - RZEPAK: 0,5 l/ha, na przedwiosniu po ruszeniu wegetacji do fazy rozwoju paków kwiatołowych BBCH 30-53
 - KUKURYDZA: 0,5 l/ha, faza 4-8 liści BBCH: 14-18
 - SŁONECZNIK: 0,5 l/ha, faza 4-8 liści BBCH 14-18
 - SOJA: 0,5 l/ha faza rozwoju liści (główny pęd) BBCH 12
 - ZIEMNIAKI: 0,5 l/ha, faza 4-5 liścico początku kwitnienia BBCH 14-61
 - WARZYWA: 0,5 l/ha, faza rozwoju liści do początku kwitnienia, BBCH 13-61
 - WINOGRONA: 0,5 l/ha, faza rozwoju liści do początku kwitnienia, BBCH 17-71
 - DRZEWA OWOCOWE: 0,5 l/ha faza rozwoju liści do początku kwitnienia, BBCH 31-61
 - BURAKI CUKROWE: 0,5 l/ha, faza rozwoju liści BBCH: 14-30

ZALECENIA STOSOWANIA

Wstrząsnąć przed użyciem.

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując produkt samodzielnie - bez mieszania z innymi. Używać czystego opryskiwacza. Minimalna ilość wody 150 l/ha – dostosować ilość wody tak aby zapewnić dobre pokrycie roślin. Nie stosować produktu 4-7 dni przed lub po użyciu herbicydów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- P102 Chronić przed dziećmi.
 P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
 P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 P501 Pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.
 Pusty pojemnik dostarczyć do miejsc utylizacji.

Produkt zawiera bakterie *Methylobacterium sp.* oraz *Arthrobacter sp.* Mikroorganizmy mogą powodować reakcję uczuleniową. Używając preparat, zawsze nosić maskę przeciwpylewą (typ EN 149 FFP3 lub podobną), rękawice i odpowiednią odzież ochronną.

Produkt nie powinien być stosowany przez osoby z obniżoną odpornością lub przechodzące leczenie immunosupresyjne.

Data produkcji:

Nr partii:

MIESZANIE Z INNYMI PREPARATAMI

INO FIX N można mieszać z większością nawozów i fungycydów dodając/rozcieńczając go w końcowym etapie przygotowania cieczy roboczej. W takich przypadkach należy wcześniej wykonać test zgodności. Zawsze dodawać INO FIX N jako ostatni produkt. Nie używać chlorowanej wody ani wybielacza, który mógłby zniszczyć bakterie i spowodować, że produkt będzie nieskuteczny. Unikać mieszania z herbicydami. Przed użyciem wyczyścić opryskiwacz, aby uniknąć obecności pozostałości innych substancji w opryskiwaczu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci, zwierząt i artykułów spożywczych, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 4°C do 25°C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i od mrozu. Nie narażać na przemrażanie i temperatury > 35°C.

UTYLIZACJA - Nie wylewać do kanalizacji; materiał oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób. Unikać uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wyprodukować trykrotonnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów.

ZASTRZEŻENIE - Producent i sprzedawcy tego produktu gwarantują, że oryginalnie zamknięte opakowanie zawiera określone w etykiecie składniki w ramach dopuszczzonej tolerancji. Nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikające z przechowywania, obsługi, stosowania lub użytkowania tego produktu.

DE SANGOSSE
 «Bonnel» - CS 10005
 47480 PONT DU CASSE
 Francja

Masa netto: **5 kg**



Dystrybutor:
 Agro Up. sp. z o.o.
 Obłąckowo 11c
 62-300 Września
www.agro-up.com.pl