



Skoncentrowany nawóz płynny do dolistnego stosowania zawierający odżywczą dawkę fosforu i potasu. Wyjątkowe zbilansowanie fosforu i potasu w INO PK SPRINT optymalizuje wzrost roślin, wybarwienie owoców oraz jakość uzyskiwanego plonu na każdym etapie rozwoju.

Skład

26% pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie (450g/l)
32% tlenek potasu (K_2O) rozpuszczalny w wodzie (550g/l)

Tylko do użytku profesjonalnego

Składniki:

Wodorofosforan dipotasowy CAS:7758-11-4 (CMC1*)

Diwodorofosforan potasowy CAS:7778-77-0 (CMC1*)

*CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny

Gęstość: 1,73

uprawa	stosowanie	dawka jednorazowa	Ilość wody	Ilość zabiegów
zboża	I. faza krzewienia BBCH 21-29 / II. od fazy strzelenia w zółdło do fazy 2 kolanka BBCH 31-32	1-2 l/ha	200-300 l/ha	I-II
rzepak	I. faza 4-8 liści BBCH 14-18 / II. faza początku wydłużania pędu głównego BBCH 30-32	1-2 l/ha	200-300 l/ha	I-II
kukurydza	I. faza 4-6 liści BBCH 14-16	1-2 l/ha	200-300 l/ha	I
buraki cukrowe	I. od fazy 4-6 liści do fazy zakrywania rzędów BBCH 14-39	1-2 l/ha	200-300 l/ha	I-II
ziemniaki	I. faza tworzenia bocznych odgałęzień BBCH 21-29 / II. faza zawiązywania bulw BBCH 41-49	1-2 l/ha	200-300 l/ha	I-II
warzywa (podlewanie rozsady)	I. podlewanie rozsady	roztwór 0,1%		I
warzywa (namaczanie korzeni)	I. namaczanie korzeni - bezpośrednio przed wysadzeniem	roztwór 0,1%		I
cebula	I. rozwój liści BBCH 16-19 / II. rozwój części przeznaczanej do zbioru BBCH 41-45	1-2 l/ha	300-500 l/ha	I-II
kapustne	I. od fazy początku tworzenia główki do osiągnięcia 50% wielkości BBCH 41-45 / II. od fazy osiągnięcia 60% wielkości główki do fazy osiągnięcia pełnej wielkości BBCH 46-49	1-2 l/ha	300-500 l/ha	I-II
korzeniowe	I. w fazie początkowej rozwoju korzenia BBCH 14-44 / II. w końcowej fazie rozwoju korzenia BBCH 45-48	1-2 l/ha	300-500 l/ha	I-II
pomidory/papryka w gruncie	I. faza rozwoju owoców BBCH 71-73 / II. faza dojrzewania BBCH 79	1-2 l/ha	300-500 l/ha	I-II
pozostałe warzywa	od fazy rozwoju liści do fazy rozwoju części przeznaczanej do zbioru	1-2 l/ha	300-500 l/ha	I-II
truskawki	I. faza wzrostu liści BBCH 16-19 / II. od fazy kwitnienia do fazy rozwoju i dojrzewania owoców BBCH 81-85	1-2 l/ha	300-500 l/ha	I-II
drzewa owocowe i rośliny jagodowe (namaczanie korzeni)	I. namaczanie korzeni - bezpośrednio przed sadzeniem	roztwór 0,1%		I
owoce borówki, malina, czereśnia, wiśnia, śliwa, winorośl	I. faza wzrostu liści / II. od fazy kwitnienia do fazy rozwoju i dojrzewania owoców	1-2 l/ha	500-800 l/ha	I-II
drzewa liściowe, jabłoni, grusza	I. faza rozwoju owoców / II. faza dojrzewania owoców	1-2 l/ha	500-800 l/ha	I-II

Wieloskładnikowy płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy - PFC1(C)(I)(b)(II) / Nawóz PK (26-32)

ZALECENIA STOSOWANIA

W celu uzyskania optymalnego efektu należy zastosować odpowiednią ilość wody, która pozwoli na pokrycie całej rośliny. Należy unikać wykonywania zabiegów w czasie silnego nasłonecznienia i/lub wysokich temperatur. Jeśli to możliwe, zabieg należy wykonać wieczorem lub wcześniej rano, szczególnie gdy wg prognozy pogody spodziewane są temperatury przekraczające 28°C w ciągu dnia. W przypadku roślin w wczesnym stadium rozwoju, w warunkach stresowych należy przyjąć zmniejszone dawki. Należy przestrzegać dawek i terminów stosowania zawartych w etykiecie dla poszczególnych upraw. Używać na wolnym powietrzu.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIECZY ROBOCZEJ

- Napełnić zbiornik opryskiwacza połową wymaganej ilości wody i włączyć mieszadło.
- Dobrze wstrząsnąć opakowaniem i dodać odpowiednią ilość nawozu do opryskiwacza. Uzupełnić zbiornik wodą do pełnej ilości, cały czas mieszając.
- W połączeniu z innymi składnikami cieczy roboczej zawsze dodawać INO PK SPRINT jako ostatni produkt. Nie zaprzestawać mieszania.
- Po zakończeniu zabiegu aparaturę dokładnie umyć.

PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku rozlania nawozu miejsca zanieczyszczone przemyć dużą ilością wody. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozu. Przechowywać w temperaturze powyżej 5 st. C.

UTYLIZACJA

Nie wylewać do kanalizacji; materiału oraz jego opakowanie zutylizować w bezpieczny sposób. Unikać uwalniania do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Pusty pojemnik wypłukać trzykrotnie. Nie palić. Nie używać pojemnika do innych celów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P102 Chronić przed dziećmi.

P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P501 Pojemnik usunąć zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.

Pusty pojemnik dostarczyć do miejsc utylizacji.

ZASTRZEŻENIE - Producent i sprzedawca tego produktu gwarantują, że oryginalnie zamknięte opakowanie zawiera określone w etykiecie składniki w ramach dopuszczzonej tolerancji, natomiast nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących korzystania z tego materiału i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia wynikające z przechowywania, obsługi lub stosowania tego produktu.

Data produkcji: na opakowaniu

Nr partii: na opakowaniu

Okres ważności: 2 lata

Masa netto:
17,2 kg

Data produkcji: na opakowaniu

Nr partii: na opakowaniu

Okres ważności: 2 lata



Dystrybutor:

Agro Up. sp. z o.o.

Obłaczkowo 11c

62-300 Września

www.agro-up.com.pl

«Bonne!» - CS 10005
47480 PONT DU CASSE
France

DE SANGOSSE

